

ORGANIKO

Organsko peletirano gnojivo - pileće



Upotreba i doziranje:

Organiko je prirodno organsko gnojivo koje upotrebljavamo u poljoprivrednoj proizvodnji i to u voćnjaku, vinogradu, vrtu, stakleniku, oranici itd.

Sadrži visok postotak organske tvari – 82 %.

Organiko poboljšava strukturu i teksturu tla, stvara optimalne uvjete za razvoj korijena i smanjuje mogućnost erozije tla.

Organiko se upotrebljava u proljeće prilikom pripreme tla, te se može koristiti tijekom cijele godine.

Kultura:

Voćnjak	3 – 7	kg/voćka
Vinograd	0,3 – 0,6	Kg/trs (sadnica)
Vrt (lisnato povrće, blitva, špinat)	10 - 12,5	Kg/50 m2
Vrt (korijenasto povrće, krastavci, rajčica)	12 – 17	Kg/50 m2
Hortikultura	8 – 12	Kg/50 m2
Krumpir i luk	7 – 10	Kg/50 m2

Pogodno za gnojidbu maslinika, agruma, travnjaka i ostalih ratarskih kultura.

Gnojivo se može rasipati ručno ili strojno ta ga ugraditi u tlo frezanjem ili oranjem.

Napomena:

Za kvalitetniji i ekonomičniji prinos poželjno je napraviti kemijsku analizu tla.

Skladištenje:

Skladištiti u natkrivenom, suhom i prozračnom prostoru.

Rok upotrebe: Neograničen

Sastav:

S.T. (105 °C)	%	80 – 90
Organska tvar	%	75 – 85
N – ukupan na S.T.	%	3,0 – 4,0
P ₂ O ₅ – ukupan na ST	%	2,5 – 3,5
K ₂ O – ukupan na ST	%	2,0 – 3,0

Teški metali:

Zn (ukupan na ST) - mg/kg - 200,8
Cu (ukupan na ST) - mg/kg – 39,0
Pb (ukupan na ST) - mg/kg – 17,54
Cd (ukupan na ST) - mg/kg – 0,940
Cr (ukupan na ST) - mg/kg – 15,62
Ni (ukupan na ST) - mg/kg – 11,33
Hg (ukupan na ST) - mg/kg – 0,0216
As (ukupan na ST) - mg/kg - <0,5
Mo (ukupan na ST) - mg/kg – 20,10
Co (ukupan na ST) - mg/kg – 1,69
Koncentracija teških metala nalazi se ispod maksimalno dopustivih prema „Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima“ – NN 152/08 (MDK)

DISTRIBUTER: Cedar agro d.o.o., Kalnička 4, HR-42220 Novi Marof, T: 042 20 50 90